

INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR

10 octombrie 2024

√ **Ordinul ministrului sănătății nr. 5028/2024 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, publicat în Monitorul Oficial nr. 1009/09.10.2024**

→ **Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023** pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 15 septembrie 2023, **se modifică după cum urmează:**

- La articolul 2, literele a), b), c), e), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"a) pentru vaccinarea împotriva gripei:

1. copii cu vârsta $> / = 6$ luni și < 19 ani;

2. gravide;

3. persoane cu vârsta $> / = 19$ ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

3.1. boli cardiovasculare cronice;

3.2. boli respiratorii cronice;

3.3. boli renale cronice;

3.4. boli hepatice cronice;

3.5. boli neurologice cronice;

3.6. boli metabolice;

3.7. boli oncologice;

3.8. boli autoimune;

3.9. malformații congenitale;

3.10. obezitate;

3.11. asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii;

3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA;

3.13. terapie imunosupresoare;

3.14. transplant;

3.15. imunosupresie congenitală;

4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

b) pentru vaccinarea împotriva infecției pneumococice:

1. copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017;

2. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

- 2.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;
 - 2.2. asplenie;
 - 2.3. pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;
 - 2.4. siclemie;
 - 2.5. boli respiratorii cronice;
 - 2.6. boli renale cronice;
 - 2.7. implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;
 - 2.8. fistule de lichid cefalo-rahidian;
 - 2.9. boli oncologice;
 - 2.10. terapie imunosupresoare;
 - 2.11. transplant;
 - 2.12. imunosupresie congenitală;
 - 2.13. drenaj ventricular extern;
 - 2.14. diabet zaharat;
 - 2.15. boli cardiovasculare;
 - 2.16. hepatopatii cronice;
 - 2.17. leucemii, limfoame, mielom multiplu;
3. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;
4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

c) pentru vaccinarea împotriva infecției meningococice:

1. persoane cu vârsta ≥ 6 săptămâni și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

- 1.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;
- 1.2. asplenie;
- 1.3. pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;
- 1.4. siclemie;
- 1.5. implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;
- 1.6. fistule de lichid cefalo-rahidian;
- 1.7. boli oncologice;
- 1.8. terapie imunosupresoare;
- 1.9. transplant;
- 1.10. imunosupresie;

1.11. deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați), de exemplu: *pacienții cu hemoglobinurie paroxistică*

nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);

2. persoane cu vârsta $> / = 65$ de ani;

.....

e) pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și pertusis-ului (tusei convulsive):

1. gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelular - dTpa, adsorbit;

2. rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, pentru adulți;

3. persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice;

4. persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti-pertussis, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant;

.....

g) pentru vaccinarea împotriva varicelei:

- persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus varicelic, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;

h) pentru vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei:

1. persoane cu transplant medular;

2. contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus rujeolos și/sau anti virus rubeolos și/sau anti virus urlian ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană."